


閱讀測驗

旋轉



如圖，將座標軸順時針旋轉 α 度，產生一新的座標系 $X' - Y'$ ，若一P點在原座標系中之座標為 (x, y) ，在新的座標系中之座標為 (x', y') ，則

$$\begin{cases} x = \cos(q + a) = \cos q \cos a - \sin q \sin a \\ y = \sin(q + a) = \sin q \sin a + \cos q \cos a \end{cases} \quad \text{且} \quad \begin{cases} x' = \cos a \\ y' = \sin a \end{cases}$$

故 $\begin{cases} x = x' \cos q - y' \sin q \\ y = x' \sin q + y' \cos q \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x' = x \cos q + y \sin q \\ y' = -x \sin q + y \cos q \end{cases}$

亦可表為 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos q & -\sin q \\ \sin q & \cos q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos q & \sin q \\ -\sin q & \cos q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

故可得新舊座標系之變換關係式

舊座標系中點 (x, y) 經旋轉矩陣 $\begin{bmatrix} \cos q & \sin q \\ -\sin q & \cos q \end{bmatrix}$ 變換後，即可得新座標系中之座標點。

新座標系中點 (x, y) 經旋轉矩陣 $\begin{bmatrix} \cos q & -\sin q \\ \sin q & \cos q \end{bmatrix}$ 變換後，即可得舊座標系中之座標點。

例 1：將座標軸順時針旋轉 30 度，則

- (1) 點 $(2, 5)$ 在座標軸旋轉後，新的座標為何？
- (2) 若新座標點為 $(4, -2)$ ，則其原座標為何？
- (3) 原座標系中方程式 $y^2 = 4x$ 經旋轉後，新方程式為何？
- (4) 若新方程式為 $3x - 4y = 5$ ，則其原方程式為何？

解：(1) $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & \sin 30^\circ \\ -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} + \sqrt{3} \\ -1 + \frac{5\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$

故新座標為 $(\frac{5}{2} + \sqrt{3}, -1 + \frac{5\sqrt{3}}{2})$

$$(2) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2\sqrt{3} \\ 2-\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

故舊座標為 $(1+2\sqrt{3}, 2-\sqrt{3})$

$$(3) \begin{cases} x = x' \cos 30^\circ - y' \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}x' - \frac{1}{2}y' \\ y = x' \sin 30^\circ + y' \cos 30^\circ = \frac{1}{2}x' + \frac{\sqrt{3}}{2}y' \end{cases} \text{代入 } y^2 = 4x \text{ , 得} \\ (\frac{1}{2}x' + \frac{\sqrt{3}}{2}y')^2 = 4(\frac{\sqrt{3}}{2}x' - \frac{1}{2}y') \text{ , 化簡得 } x'^2 + 2\sqrt{3}x'y' + 3y'^2 - 8\sqrt{3}x' + 8y' = 0$$

$$(4) \begin{cases} x' = x \cos 30^\circ + y \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \\ y' = -x \sin 30^\circ + y \cos 30^\circ = -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y \end{cases} \text{代入 } 3x - 4y = 5 \text{ 得} \\ 3(\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y) - 4(-\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y) = 5 \text{ 化簡得 } (3\sqrt{3} + 4)x + (3 - 4\sqrt{3})y - 10 = 0$$